

ESTREPTOCOCOS (*Streptococcus pyogenes*)

Normativa para establecimientos escolares.

El *Streptococcus pyogenes*, causa un amplio espectro de manifestaciones clínicas de enfermedad, desde cuadros leves, como faringitis, impétigo, escarlatina, hasta infecciones invasivas.

Las formas más frecuentes son las amigdalitis o faringitis con exudado, acompañado de fiebre. Las otras manifestaciones frecuentes son a nivel de la piel (celulitis, erisipela). La forma invasiva y grave, se da en un porcentaje mucho menor, y esto está condicionado por el estado inmunológico (defensas) que tenga el paciente, entre otras variables.

Las faringoamigdalitis, provocan dolor al tragar, fiebre, decaimiento y en ocasiones náuseas y vómitos.

Agente causal: *Streptococcus pyogenes*

Modo de transmisión: diseminación de persona a persona a través de propagación aérea de gotitas/secreción de las vías respiratorias y por contacto con recipientes de una persona que portadora de la bacteria.

El niño deja de contagiar 24-48 horas después de ser medicado con antibiótico adecuado.

El periodo de incubación: de 1 a 3 días. (Desde el ingreso de la bacteria y hasta la aparición de los síntomas)

Métodos de control:

Medidas de higiene habituales. Lavado de manos frecuente, estornudar o toser en el pliegue del codo o en pañuelos descartables, ventilar el establecimiento a diario.

No se recomienda el cierre del establecimiento escolar.

El paciente que padeció la enfermedad, debe concurrir con el alta del profesional médico.