

CASO SOSPECHOSO COVID-19

BAJA SOSPECHA PRE-TEST DE COVID-19

- Nexa epidemiológico no reúne criterios de contacto estrecho y/o procedencia

1° rRT-PCR en muestra nasofaríngea

NO DETECTABLE

DETECTABLE

SE DESCARTA CASO SOSPECHOSO

CONFIRMA CASO

Evaluar y Documentar otras etiologías que justifiquen el cuadro clínico

ALTA SOSPECHA PRE-TEST DE COVID-19

- Nexa epidemiológico
- Hallazgos clínicos y/o laboratoriales sugestivos
- Imágenes sugestivas

1° rRT-PCR en muestra nasofaríngea

Evaluar y Documentar otras etiologías que justifiquen el cuadro clínico

NO DETECTABLE / NO CONCLUYENTE

DETECTABLE

REPETIR rt-PCR ENTRE LAS 48-72 HORAS SEGÚN SÍNTOMAS y FECHA DE INICIO DE ÉSTOS

CONFIRMA CASO

Si el paciente presenta neumonía considerar 2° PCR de muestra respiratoria baja (BAL)

2° rRT-PCR

NO DETECTABLE / NO CONCLUYENTE

DETECTABLE

Ac Totales (ECLIA) IgA/IgM (ELISA)

Ac Totales negativos IgA/IgM negativos

Ac Totales positivos IgA/IgM negativos

Ac Totales positivos IgA/IgM positivos

Ac Totales negativos IgA/IgM positivos

Possible periodo de ventana serológica

Repetir Ac Totales a los 2 semanas (muestras pareadas)

NEGATIVOS

POSITIVOS

Seroconversión

SE DESCARTA COVID-19

CASO PROBABLE

Paciente puede estar en estadio precoz de la infección

Repetir Ac Totales a los 2 semanas (muestras pareadas)

POSITIVOS

NEGATIVOS

Seroconversión

SE DESCARTA COVID-19