

Severidad de la COVID-19

SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD	DEFINICIÓN
ASINTOMÁTICO	Pacientes asintomáticos que fueron testeados por situaciones especiales con resultado de rRT-PCR detectable.
LEVE	Pacientes sintomáticos que cumplen con la definición de casos SIN EVIDENCIA de neumonía o hipoxemia.
MODERADO	Pacientes que presenten signos clínicos/radiológicos de neumonía (no severa) con SatO ₂ ambiental ≥94%.
SEVERO	Pacientes que presenten signos clínicos/radiológicos de neumonía Y uno de los siguientes parámetros de gravedad: - FR ≥30 RPM - SatO ₂ ambiental ≤93% - Requerimiento de ARM - Incremento de infiltrado pulmonares >50% en 24-48 horas. - Alteración de conciencia-deterioro del sensorio. - Inestabilidad hemodinámica. - CURB-65≥2 puntos - Requerimiento de UTI
CRÍTICA	Paciente con cualquiera de los siguientes: Síndrome de Distres Respiratorio ó Sepsis ó Shock Séptico

SCORES/CRITERIOS

CRITERIO IDSA/ATS

Criterios para definir severidad de la neumonía

Criterios Principales:

- Dificultad respiratoria que requiere ventilación mecánica.
- Shock séptico

Criterios Menores:

- Confusión
- FR >30 rpm
- BUN o uremia >7 mmol/l
- Leucopenia resultante de una infección
- Trombocitopenia
- Hipotermia
- Hipotensión que requiere fluidos agresivos
- PaO₂/FiO₂<250
- Infiltrados multilobares

CRITERIOS SOCIALES

- Autoválido con movilidad adecuada y sin deterioro cognitivo.
- Entendimiento y aplicación de forma correcta y consistente de las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección.
- Ubicabilidad: teléfono con comunicación permanente, domicilio en barrio accesible, domicilio con proximidad a centros de atención médica para reconsulta en caso de mala evolución clínica, etc.
- Posibilidad de concurrir para ser asistido en caso de empeorar su estado clínico.
- Posibilidad de cumplimiento de aislamiento en domicilio:
- Habitación de uso individual que pueda cerrar la puerta y con ventilación adecuada directa al exterior (ventana).
- Conexión segura agua potable en el interior de la vivienda.
- Baño de uso exclusivo o posibilidad de higiene luego de cada uso.
- Ausencia en domicilio de personas con factores de riesgo (≥ 60 años y/o factores de riesgo de mortalidad como hipertensión arterial severa, cardiopatía crónica, EPOC, diabetes, insuficiencia renal crónica terminal, pacientes con cáncer activo, trasplantados u otros inmunosuprimidos).
- Posibilidad de rehospitarse en los casos de requerirlo.

