

# Tamizaje de **Cáncer Colorrectal**



MENDOZA

## PREVENCIÓN DEL CÁNCER COLORRECTAL. mantener hábitos saludables:



no fumar



consumir  
frutas y  
verduras  
crudas



realizar  
30 minutos  
de actividad  
física  
diariamente



moderar  
el consumo  
de alcohol



controlar la  
circunferencia  
de cintura  
hombre: <102 cm  
mujer: <88 cm

## A

### IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE TENER CCR:

Grupo de <b>RIESGO ALTO</b>	Grupo de <b>RIESGO MODERADO</b>	Grupo de <b>RIESGO BAJO O PROMEDIO</b>
(5-10% del total de la población)	(20-30% del total de la población)	(70-80% del total de la población)
<p><b>Personas con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antecedente familiar de poliposis adenomatosa familiar (<b>PAF</b>)</li> <li>• Antecedente de CCR hereditario familiar no asociado a poliposis (<b>síndrome de Lynch</b>)</li> <li>• Enfermedad inflamatoria intestinal (<b>colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn</b>).</li> </ul>	<p><b>Personas con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antecedente personal de adenomas (se subdivide este grupo teniendo en cuenta el tamaño y número de los adenomas, la histología vellosa o grado de displasia)</li> <li>• Antecedente personal de CCR resecaado previamente con intento curativo</li> <li>• Antecedente de CCR o pólipos adenomatosos en un familiar de 1º grado menor de 60 años o en dos familiares de 1º grado independientemente de la edad.</li> </ul>	<p><b>Se encuentra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toda la población de 50 o más años de edad sin factores de riesgo</li> <li>• Personas con antecedente familiar de CCR o adenomas en un familiar de 2º o 3º grado</li> <li>• Personas con antecedente familiar de CCR o adenomas en un familiar de 1º grado (madre, padre, hermano, hijo) mayor de 60 años o en dos familiares de 2º grado.</li> </ul>

## B

### DERIVACIÓN OPORTUNA SEGÚN GRUPO DE RIESGO:

**RIESGO MODERADO Y ALTO**



Consulta con Gastroenterólogo



**RIESGO PROMEDIO**

(con colonoscopia reciente o TSOMF menor a 2 años)



Consulta con Gastroenterólogo



**RIESGO PROMEDIO**

(sin colonoscopia reciente, sin TSOMF o TSOMF mayor a 2 años)



Test de Sangre oculta en materia fecal (TSOMF)



## C

### PRUEBA DE TAMIZAJE CON TSOMF:

**SI ES NEGATIVO**



REPETIR A LOS 2 AÑOS

**SI ES POSITIVO**



DERIVAR A COLONOSCOPIA

