

CASO SOSPECHOSO EN POBLACIÓN GENERAL*

Toda persona que vive o haya viajado en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas a zonas con transmisión de dengue o presencia del vector, y presenta fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y dos o más de las siguientes manifestaciones: náuseas/vómitos; exantema/sarpullido; cefalea/dolor retroocular; mialgia/artralgia; petequias o prueba de torniquete positiva (+); leucopenia (con o sin ningún signo de alarma o manifestación de gravedad).

- PONDERAR:**
- ¿En qué fase del dengue se encuentra? (Febril/crítica/recuperación).
 - ¿Tiene signos de alarma?
 - ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación?
 - ¿Está en choque?
 - ¿Tiene enfermedad o condición asociadas o riesgo social?
 - ¿Requiere hospitalización?

“CHECK LIST” para control clínico

- 1) Nivel de conciencia.
- 2) Frecuencia cardíaca.
- 3) Frecuencia respiratoria.
- 4) Presión arterial.
- 5) Presión y característica pulso periférico.
- 6) Llenado capilar.

SIGNOS DE ALARMA

- **Dolor abdominal:** intenso y sostenido o dolor a la palpación.
- **Trastorno del sensorio:** irritabilidad o somnolencia.
- **Sangrado de mucosas:** gingivorragia o epistaxis persistentes, sangrado vaginal no asociado a la menstruación o sangrado menstrual mayor de lo habitual y hematuria.
- **Acumulación de líquidos:** por clínica y/o por estudios.
- **Hepatomegalia:** de instalación brusca.
- **Vómitos:** persistentes (tres o más en una hora o cuatro en seis horas).
- **Aumento progresivo del hematocrito:** en al menos dos mediciones consecutivas.

ATENCIÓN: un único signo es indicativo de una mala evolución.

COMORBILIDADES O CONDICIONES ASOCIADAS

- Embarazo.
- ≤ 1 año.
- ≥ 65 años.
- Enfermedad Renal.
- Obesidad mórbida.
- Diabetes.
- Enfermedades hemolíticas.
- Hepatopatía crónica.
- Enfermedad úlcero péptica o gastritis de cualquier etiología.
- En tratamiento con anticoagulantes.
- Presentan riesgo social.

CRITERIOS PARA EVALUAR HOSPITALIZACIÓN

- Dengue con presencia de uno o más signos de alarma.
- Dengue con presencia de algún signo de gravedad (choque, dificultad respiratoria, sangrado grave o compromiso de órganos).
- Intolerancia a la vía oral.
- Dificultad respiratoria.
- Acortamiento de la presión de pulso.
- Hipotensión arterial.
- Insuficiencia renal aguda.
- Aumento del tiempo de llenado capilar.
- Embarazo.*
- Coagulopatía.
- Menores de 6 meses.
- Evaluar situación social.

*En el caso de embarazadas que no posean otro factor de riesgo adicional y especialmente en escenarios de brote o saturación del sistema de salud, evaluar un control ambulatorio en aquellas gestantes candidatas a un control diario.

CLASIFICAR

GRUPO A

Dengue sin signos de alarma (DSSA). Persona que cumple criterios de caso sospechoso o confirmado de dengue.

GRUPO B1

Dengue sin signos de alarma (DSSA). Persona que cumple criterios de caso sospechoso o confirmado de dengue y tenga alguna **comorbilidad o condición asociada**.

GRUPO B2

Dengue con signos de alarma (DCSA). Persona que cumple criterios de caso sospechoso o confirmado de dengue y tenga al menos un signo de alarma.

GRUPO C

Dengue grave (DG). Persona que cumple criterios de caso sospechoso o confirmado de dengue y tenga al menos un signo de gravedad.

Escaneá el código para acceder a los algoritmos de tratamiento según clasificación de casos

