¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE?

- No capturar aves y pájaros silvestres ni comprarlos en la vía pública.
- Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente.
- Alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias.
- No permanecer largos periodos en habitaciones cerradas donde haya aves.
- No introducir aves recientemente capturadas o compradas, sin certificado sanitario, en jaulas donde ya hay otras aves.

Producción: EDUCACIÓN PARA LA SALUD (4/22)

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y VECTORIALES
Rodríguez 1209, Ciudad - Tel: 4235527 - 4202495
zoonosis@mendoza.gov.ar

Laboratorio de Zoonosis
Talcahuano s/n (Hospital Lencinas) Tel: 4270784
labzoonosis@mendoza.gov.ar

DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS
Rondeau 50, 2º Piso, Ciudad de Mendoza. Tel: 0261 - 4290782

Ante cualquier consulta diríjase al Área de Zoonosis y/o similar de su Municipio.

MENDOZA
GOBIERNO

PSITACOSIS

¿QUÉ ES?

Es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada causada por la *Chlamydia psittaci*, un tipo de bacteria que se encuentra en los excrementos de pájaros infectados, los cuales transmiten la infección a los humanos.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Se transmite a las personas a través de aves infectadas como loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas. Cuando estas aves están enfermas eliminan Chlamydias al medio ambiente a través de secreciones oculares o respiratorias, excrementos secos y polvo de las plumas. Estas secreciones se secan, permanecen en el aire y son aspiradas por las personas, que de esta forma se infectan.



¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

El cuadro clínico de la psitacosis puede variar entre infección sin enfermedad evidente y enfermedad febril inespecífica o neumonía. La neumonía inicia con un cuadro de afectación general: **hipertermia** (cuerpo caliente), **dolor de cabeza** (síntoma constante), **decaimiento, fatiga y cansancio.**

A las **24 o 48 horas** comienza la **tos con expectoración escasa,** en general mucosa y viscosa. También pueden aparecer **ictericia** (la piel se pone amarilla), **esplenomegalia** (aumento del bazo) y **alteraciones de la percepción.**

Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a veces es grave, especialmente en los adultos mayores y ancianos que no reciben tratamiento.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

Las personas con psitacosis deben recibir antibióticos durante 14 días.

Los contactos de la persona enferma (familiares o compañeros de trabajo) deben ser controlados para identificar la aparición de síntomas en forma precoz.